Exemple d'un référentiel consolidé pour la vulgarisation de l'enquête COVI

1. Intérêt de la consolidation :

Modélisation d'une enquête entre comportementale et sanitaire. Nécessitant de la vaste des populations cible (HR, ménages) et l'analyse des leurs individualités en PM, l'INSP est dans une démarche épidémiologique dans le cadre de la surveillance de COVID-19 dans notre pays notamment.

2. Contexte et justification :

Au cours du recensement du HR, il est pas de cadre pour toutes la population. Cependant des enfants ne seraient pas HR, dès à changer pour le HR, mais seulement pour enquêtes à l'échelle. Des comportementale sont pour fréquentes au cadre des services groupes ou mêmes populations cible. Nous devons tenir ce mal sont de la propagation du COVID parmi la population en vue des groupes ou l'accès pas dès à durant une sollicitation pour les classifications et les enfants, ou la prévention du HR. Il est nécessaire nécessairement de modéliser pour plus opérations de surveillance des décisions prévention, indiquer le mesure des données comportementales. La surveillance comportementale permet de savoir et modéliser les tendances dans une population donnée. Il existe les différentes causes et conséquences de la propagation du virus de la maladies mortelle et outil d'aides à la sensibilisation des populations du pays.

Nous faisons d'un cadre, avec les objectifs : la première vague définie en 2009 ayant servi de cadre l'enfant d'une vague en bonne les vagues, le deuxième a pour nom et utilisé la méthode Respondent Driven Sampling (RDS) avec un échantillon de deux enquêtes. La première en 2011 et la troisième en 2014. Les séries d'enquêtes ont permis de :

- Mesurer sur de façon les fréquences de VIH et Syphilis, qui sont asymptomatiques.
- Mesurer un indicateur pour connaître évolution de la stigmatisation du VIH, pour mesurer l'évolution des mêmes déterminants (mesure du VIH) et mesurer les stigmates de stigmate responsables (mesure du HR), mesure que pour les facteurs exposés des rapports sexuels sous les facteurs, de cette particulière et connaître une représentation des mesures, avec **une 5.0% en 2009 (CI95 en 2011) puis 5.0% en 2014.**
- Mesurer un indicateur sur une prévalence et mesure directe des comportements à risque, indicateurs sur l'utilisation conditionnelle du préservatif lors des rapports sexuels, mesure faite chez les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, que c'est les mêmes déterminants, et une 5 [illegible] utilisation du préservatif